

# 郭綜合醫院

## 胚胎植入患者須知單

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

胚胎植入全期： 月 日開始 × 30 天

1. 每天二顆：每天二次口服\_\_\_顆口服類固醇 (Prednisolone)，全部使用完畢
2. 每天一顆：每天一次口服\_\_\_顆口服伯基 (Bokey)，全部使用完畢
3. 每天一顆：每天一次口服\_\_\_顆口服葉酸 (Folic acid)，全部使用完畢

冷凍胚胎植入前：雌性素準備期

1. 每天\_\_\_顆：每天\_\_\_次口服\_\_\_顆雌性素 (Estrade)
2. 每天二支：每天早晚使用一支「快孕隆 (Crinone) 黃體素陰道凝膠」
3. 每天四顆：每天四次口服\_\_\_顆口服黃體素 (Utrogestan) / 得隆胎 (Duphaston)
4. 每天三顆：每天三次口服\_\_\_顆抗生素 (Keflex) × 5 天全部使用完畢
5. 植入術後針劑使用須知：
  - (1) HCG (1500、5000IU、6500IU、\_\_\_\_\_) ( 月 日、 月 日、 月 日) 以肌肉注射各施打一劑
  - (2) 黃體素油針 (Progesterone \_\_\_mg) ( 月 日、 月 日、 月 日、 月 日、 月 日) 以肌肉注射各施打一劑
6. 月 日為植入後第\_\_\_天，請於檢驗科抽血
7. 月 日為植入後第\_\_\_天，請於檢驗科抽血，再至二環門診看報告。

植入後注意事項

1. 建議休息 4-6 小時，才可離開醫院，無須絕對臥床休息，不宜憋尿，小心膀胱發炎及便秘。
2. 胚胎著床時間為第 7-8 天胚胎，3 天內盡量放鬆休息。
3. 禁止劇烈活動及過度跑跳，不宜提重物及久蹲久站。
4. 若有紅色、咖啡色分泌物下腹劇烈疼痛，請來電本院生殖中心：06-2221111#2250。